



ОБЛАСТНОЙ  
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



## РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН

- + ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОЛОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
- + ПЛАНРИУЙТЕ БЕРЕМЕННОСТЬ
- + ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ И АЛКОГОЛЯ
- + ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ
- + УЧИТЫВАЙТЕ ВОЗРАСТ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
- + ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ
- + СОБЛЮДАЙТЕ ГИГИЕНУ
- + ПРОХОДИТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
- + СОХРАНЯЙТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ





ОБЛАСТНОЙ  
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

## ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ

Своевременное  
выявление и лечение  
предраковых  
заболеваний  
(эррозия шейки матки и др.)



Профилактика  
абортов



Отказ  
от случайных  
сексуальных связей



Отказ  
от употребления  
табака,  
алкоголя



Вакцинация  
против папилло-  
мовирусной  
инфекции



Профилактика заболеваний,  
передающихся половым  
путем (ЗПП), – верность  
партнеру, использование  
презервативов и регулярные  
визиты к врачу



Профилактический  
осмотр у гинеколога  
с обязательным  
взятием мазка  
на онкоцитологию



Укрепление иммунитета  
(правильное питание,  
профилактика стрессов,  
физическая активность)





# САМООБСЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

## КОГДА ПРОВОДИТЬ?

Самообследование надо проводить регулярно, один раз в месяц, в период с 6 по 12 день от начала менструации. Для женщин в менопаузе - в любой день месяца.

## НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

На любые изменения груди, такие как: нагрубание молочных желез, покраснения, воспаления, стянутая или отекшая кожа, выделения из сосков.

1



Встаньте перед зеркалом и осмотрите форму груди и внешний вид кожи и сосков.

! Проверьте, нет ли изменений величины, формы, контуров груди, нет ли смещения одной из желез в сторону.

2



Поднимите руки вверх и осмотрите грудь сначала спереди, затем с обеих сторон.

! Проверьте, не образуются ли при этом возвышения, западания, втягивания кожи или соска, не появляются ли капли жидкости из соска, нет ли изменений цвета кожи, сыпи, опрелости, сморщенности, изменений, напоминающих "лимонную корку".

3



В положении стоя надавите на грудь тремя средними пальцами руки (правой рукой исследуйте левую грудь, левой - правую)

4



Начните с верхней внешней четверти - ткань железы здесь обычно более плотная - и далее продвигайтесь по часовой стрелке.

! Проверьте, нет ли необычных бугорков или уплотнений под кожей.

5



Сожмите каждый сосок большими и указательными пальцами.

! Посмотрите, не выделяется ли жидкость.

6



В положении лежа вновь обследуйте по кругу каждую четверть груди (как в пункте 4).

! Пальпация в положении лежа - самая важная часть самопроверки. Ее проводят на твердой, плоской поверхности. Можно подложить под обследуемую железу валик или твердую подушку.

7



Прощупайте подмышечные и надключичные впадины.

! Проверьте, нет ли там уплотнений, увеличенных лимфоузлов.

8



Тщательно осмотрите бюстгальтер.

! Проверьте, нет ли на нем следов выделения из соска в виде кровянистых, бурых, зеленоватых или желтоватых пятен, корок.

Если вы заметили хотя бы один из тревожных признаков или установили какие-то изменения в состоянии груди с момента прошлого осмотра, немедленно обращайтесь к своему лечащему врачу (акушеру-гинекологу в женскую консультацию, хирургу или врачу общей практики).



ОБЛАСТНОЙ  
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

## ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОЛОВЫХ ИНФЕКЦИЙ



ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ВОСПАЛЕНИЯ  
В ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА – ПОЛОВЫЕ ИНФЕКЦИИ.  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗПП (ЗАБОЛЕВАНИЯ,  
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ)  
ПОЯВЛЯЮТСЯ ИЗ-ЗА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ  
БАРЬЕРНЫМИ СПОСОБАМИ КОНТРАЦЕПЦИИ  
И ОТСУТСТВИЯ ПРИВЫЧКИ РЕГУЛЯРНО  
ПОКАЗЫВАТЬСЯ ГИНЕКОЛОГУ.

ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ЗПП, СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО  
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА  
И САМОЛЕЧЕНИЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ  
И ЗАРАЖЕНИЮ ПАРТНЕРА.

### ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ЭТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

ЗПП ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮТСЯ ВИРУСАМИ И БАКТЕРИЯМИ,  
НО ЕСТЬ БОЛЕЗНИ ИЗ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ, РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ  
ПРОВОЦИРУЮТ ГРИБКИ ИЛИ ПАРАЗИТЫ.

### Первые симптомы ЗПП

Симптомы ЗПП варьируются,  
но наиболее распространены  
следующие:

- необычные прыщи, корочки,  
покраснения или язвы,
- зуд, болезненность в районе  
половых органов,
- боль при мочеиспускании,
- необычные выделения  
из половых органов.





## ЖЕНСКИЙ СТРЕСС – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?



Если раньше женщина занималась в основном домашним хозяйством и воспитанием детей, то сейчас она вынуждена совмещать домашние обязанности со своей профессиональной деятельностью. В итоге усталость женщины копится, приводя к развитию синдрома хронической усталости и психосоматических заболеваний.

**СТРЕСС У ЖЕНЩИН ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕН:**

- **ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ** (предменструальный синдром, климактерический период)
- **ПЕРЕМЕНАМИ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ** (замужество, материнство, развод, уход за родителями, уход детей из семьи, потеря близких)
- **ПОЛОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ** (устройство на работу бывает осложнено наличием детей дошкольного возраста или их возможным появлением, а на руководящую должность при равных способностях скорее всего будет выбран мужчина)
- **ЖИЗНЕННЫМИ КРИЗИСАМИ** (например, несложившаяся личная жизнь, невозможность стать матерью)
- **ВЫНУЖДЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ** (одинокая мама, в т.ч. по потере кормильца)
- **НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНЮ** (физическое, психологическое и экономическое насилие, алкоголизм в семье)
- **и т.д.**





# ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

## КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ИЛИ МИНИМИЗИРОВАТЬ СТРЕСС У ЖЕНЩИНЫ

УЧИТЕСЬ  
РАССЛАБЛЯТЬСЯ

ОТКАЖИТЕСЬ  
ОТ КУРЕНИЯ  
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  
АЛКОГОЛЕМ

ВЫСЫПАЙТЕСЬ

УЧИТЕСЬ ПРИНИМАТЬ  
ВЕЩИ И ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ  
НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ,  
И НАХОДИТЬ РЕСУРСЫ  
ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

ОСТАВЛЯЙТЕ  
ЕЖЕДНЕВНО  
КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ  
ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ

ПИТАЙТЕСЬ  
РАЦИОНАЛЬНО

СТАВЬТЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
И ДОСТИЖИМЫЕ  
ЦЕЛИ



ИЩИТЕ СВОИ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ  
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

ОТДЕЛЯЙТЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  
РОЛЬ  
И ВАШУ ЛИЧНОСТЬ

СООТНОСИТЕ ЧУЖИЕ  
ЖЕЛАНИЯ С ВАШИМИ  
ПОТРЕБНОСТЯМИ,  
ПРАВО ВЫБОРА –  
ТОЛЬКО ЗА ВАМИ!

ОБРАЩАЙТЕСЬ  
ЗА ПОМОЩЬЮ  
К СПЕЦИАЛИСТАМ

РЕГУЛЯРНО  
ДВИГАЙТЕСЬ

ПЛАНИРУЙТЕ  
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ,  
НАХОДИТЕ ВРЕМЯ  
ДЛЯ ЗАБОТЫ О СЕБЕ

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ НАЕДИНЕ  
СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ,  
ИЩИТЕ ПОДДЕРЖКУ СРЕДИ  
БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ

РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ  
ОБЯЗАННОСТИ  
ПО ДОМУ СРЕДИ  
ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ



## ОЖИРЕНИЕ И ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Ожирение представляет собой одну из наиболее грозных эпидемий современности, которая поражает людей независимо от их возраста, пола, места проживания.


По статистике ВОЗ, в экономически развитых странах около 30% взрослых и до 10% детей имеют ту или иную форму и степень ожирения. Распространенность ожирения растет в геометрической прогрессии: через 25 лет предполагается двукратное увеличение количества полных людей.

### КАК ОЦЕНИТЬ – ЕСТЬ У МЕНЯ ОЖИРЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

Используйте индекс массы тела (ИМТ):

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{вес [кг]}}{\text{рост [м]}^2}$$

Оптимальным вес считается при ИМТ 18,5 - 24,9.



Избыточным – при ИМТ 25 - 29,9.  
Об ожирении можно говорить,  
если ИМТ больше 30!



**ОЖИРЕНИЕ – это хроническое заболевание, проявляющееся избыточным увеличением массы тела преимущественно за счет чрезмерного накопления жировой ткани.**

Различают два типа ожирения: **по мужскому типу** или **абдоминальное** (характеризуется отложением жира в пределах верхней части тела, живота) и **по женскому типу** (в пределах нижней части тела). Абдоминальное ожирение считается более опасным, т.к. напрямую связано с развитием метаболического синдрома (нарушения липидного и углеводного обмена), диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний.

**Абдоминальный тип ожирения можно распознать:**  
по окружности талии у женщин > 80 см  
и по индексу — соотношению окружности талии к окружности бедер, который в этом случае будет > 0,8.



# ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

В ЧЕМ ЖЕ ЗАБЛУЖДАЮТСЯ ДАМЫ С СИГАРЕТОЙ В РУКАХ?

## МИФ

1

«ЛЕГКИЕ» ДАМСКИЕ СИГАРЕТЫ  
НЕ ТАК ВРЕДЯТ ОРГАНИЗМУ



ПОМНИТЕ! КУРЕНИЕ ЛЮБЫХ  
СИГАРЕТ ОПАСНО  
для здоровья,  
это доказанный факт!


- А Д А КОЛИЧЕСТВО НИКОТИНА И СМОЛ В «ЛЕГКИХ» СИГАРЕТАХ ЧУТЬ МЕНЬШЕ, но эта разница – совсем незначительная.
- В Д ВРЕД КУРЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕН ДАЛЕКО НЕ ТОЛЬКО НИКОТИНОМ, в составе сигарет содержатся тысячи других опасных веществ .
- Р А РАДА Для получения привычной дозы никотина человек, перешедший на «ЛЕГКИЕ» сигареты, будет глубже затягиваться, выкуривать сигарету до самого фильтра или обычную сигарету заменит несколькими «легкими».
- П ПИДА От перехода на «ЛЕГКИЕ» сигареты зависимость не ослабнет.

Что еще важно - тест «Мальборо», «Кента», «Лаки Страйк» показал, что содержание нитрозаминов (самые сильные канцерогены табака) является высоким! НИТРОЗАМИНЫ ВЫЗЫВАЮТ РАК ЛЕГКИХ, ПИЩЕВОДА, ПОЛОСТИ РТА, ГОРТАНИ, ГЛОТКИ, ЖЕЛУДКА, ПЕЧЕНИ.

## МИФ

2

КУРЕНИЕ ТАБАКА ПОМОГАЕТ  
ОБЛЕГЧИТЬ ЧУВСТВО БЕСПОКОЙСТВА  
И СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ СТРЕССА



- А Д А УСТРАНЕНИЕ НИКОТИНОМ БЕСПОКОЙСТВА И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ, НАБЛЮДАЕМОЕ ПРИ СИСТЕМАТИЧЕСКОМ КУРЕНИИ, ВО МНОГОМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ПСИХИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ НЕГО.
- В Д ВРАСТРАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В НИКОТИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ СТРЕССА ДЛЯ КУРИЛЬЩИКА,
- Р А РАДА ЧУВСТВО ОБЛЕГЧЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНА ОБЫЧНО И ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК РАССЛАБЛЕНИЕ.
- П ПИДА ДОКАЗАНО, ЧТО УРОВЕНЬ ПОДВЕРЖЕННОСТИ СТРЕССУ У КУРЯЩИХ, ПОПАВШИХ В УСЛОВИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫШЕ, ЧЕМ У НЕКУРЯЩИХ.

КУРЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ ЧАЩЕ СТРАДАЮТ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ  
И ЗАБОЛЕВАЮТ РАНЬШЕ МУЖЧИН



# ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

В ЧЕМ ЖЕ ЗАБЛУЖДАЮТСЯ ДАМЫ С СИГАРЕТОЙ В РУКАХ?

## МИФ

3

## БРОСИШЬ КУРИТЬ - РАСТОЛСТЕЕШЬ



Б  
О  
Я  
З  
Б  
О  
З  
Я  
П  
Р  
А  
В  
Д  
А

БОЯЗНЬ ПОПРАВИТЬСЯ – ВЕСОМОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, НО ДЕЛО ВОВСЕ НЕ В ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ, А В ТОМ, ЧТО ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ЗАЕДАТЬ СТРЕСС, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ, И ЕДЯТ ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В СИТУАЦИЯХ, КОГДА РАНЬШЕ ЗАКУРИВАЛИ.

П  
Р  
А  
В  
Д  
А

ПРИ ОТКАЗЕ ОТ СИГАРЕТ К ЧЕЛОВЕКУ ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРЕЖНИЙ УРОВЕНЬ ОБОНИЯНИЯ И ВКУСА, ЧТО ТАКЖЕ ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ АППЕТИТА, А ПОЗДНЕЕ – К НАБОРУ ВЕСА.

П  
Р  
А  
В  
Д  
А

ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЭТИ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ ТАК ВЫРАЖЕНЫ, КАК ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ.

КУРЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАБОЛЕВАЮТ РАКОМ ЛЕГКИХ В БОЛЕЕ МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ, ЧЕМ МУЖЧИНЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ КУРЯТ МЕНЬШЕ.

## МИФ

4

## ЧТОБЫ РОДИЛСЯ ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК, ДОСТАТОЧНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ НА ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ



Б  
О  
Я  
З  
Б  
О  
З  
Я  
П  
Р  
А  
В  
Д  
А

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА СМОЖЕТ НЕ КУРИТЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ – ЭТО УЖЕ ХОРОШО!

П  
Р  
А  
В  
Д  
А

НО ЯЙЦЕКЛЕТКИ ЖЕНЩИНЕ ДАНЫ С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ, ОНИ НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ, ПОЭТОМУ КУРЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ УЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТ В БУДУЩЕМ РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ПАТОЛОГИЕЙ. ПОДТВЕРЖДАЮТ ЭТО И СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ: СРЕДИ ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ КУРЕНИЯ ЗА ГОД ДО НАЧАЛА БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИН РИСК ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОКАЗАЛСЯ ПОВЫШЕН.

П  
Р  
А  
В  
Д  
А

КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ ЖЕНЩИНА РЕШИТ ВНОВЬ ВЕРНУТЬСЯ К КУРЕНИЮ ПОСЛЕ РОДОВ, ОНА ДОЛЖНА ПОНИМАТЬ, ЧТО МАЛЫШ БУДЕТ «КУРИТЬ» ВМЕСТЕ С НЕЙ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ КУРИТЕ, ИЗБЕГАЙТЕ НАХОЖДЕНИЯ  
В НАКУРЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ!