АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД СКРИНИНГА РАКА КИШЕЧНИКА

Правила забора материала:

- ***Не менее 50 г.*** (размером чуть меньше грецкого ореха);
- Отбирается кал после самопроизвольной дефекации ***из разных участков*** (не менее трех участков);
- ***Хранение:*** - в течение 120 мин при t = + (20-25)°C, - возможно хранение до 24 ч при t = + (4-8)°C.

Перед забором материала исключить:

- прием слабительных и/или ферментных препаратов, ректальных свечей;
- проведение инструментальных исследований, лечебных процедур желудочно-кишечного тракта (за 3 дня до забора кала).

Ограничений в употреблении продуктов питания нет.