

Показания к направлению на дообследование в рамках второго этапа диспансеризации или вне рамок профилактического медицинского осмотра

Осмотр (консультация) специалиста / метод исследования	Показания
Врач-невролог	1) При наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное ОНМК для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением; 2) В случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением.
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий	1) Мужчины в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщины в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития ХНИЗ: <ul style="list-style-type: none"> • повышенный уровень артериального давления (САД \geq 140 и/или ДАД \geq 90 мм рт. ст. и/или наличие диагноза гипертонической болезни или симптоматической артериальной гипертензии); • гиперхолестеринемия 5 ммоль/л и более; • избыточная масса тела или ожирение; 2) По направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное ОНМК для граждан в возрасте от 65 до 90 лет , не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением.
Врач-хирург или врач-уролог	Мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл .
Врач-хирург или врач-колопроктолог + ректороманоскопия	Граждане в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление ЗНО толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) ЗНО толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов ЗНО толстого кишечника и прямой кишки
Колоноскопия	В случае подозрения на ЗНО толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога.
Эзофагогастродуоденоскопия	В случае подозрения на ЗНО пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта.
Акушер-гинеколог	Женщины: <ul style="list-style-type: none"> • в возрасте 18 лет и старше с выявленными патолог. изменениями по результатам скрининга на выявление ЗНО шейки матки, • в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патолог. изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление ЗНО молочных желез.
Врач-отоларинголог	Граждане в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта.
Врач-офтальмолог	1) Граждане в возрасте 40 лет и старше , имеющие повышенное внутриглазное давление; 2) Граждане в возрасте 65 лет и старше , имеющие снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования.
Врач-дерматолог	Граждане с подозрением на ЗНО кожи и (или) слизистых оболочек

+ дерматоскопия	по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.
Рентгенография легких, компьютерная томография легких	В случае подозрения на ЗНО легкого по назначению врача-терапевта.
Спирометрия	Граждане с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящие граждане, выявленные по результатам анкетирования, - по назначению врача-терапевта.
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (норма: HbA1c ≤ 6,0% (≤ 42 ммоль/моль))	Граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации. - цельная капиллярная кровь: ≥ 5,6 ммоль/л (кровь из пальца); - венозная плазма: ≥ 6,1 ммоль/л (кровь из вены).
Проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) углубленного профилактического консультирования в течение 25-30 минут в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья	Граждане: а) с выявленной ИБС, ЦВБ, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением; б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; в) все в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении; г) при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленным по результатам анкетирования курению более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Список сокращений:

ЗНО – злокачественное новообразование;

ИБС – ишемическая болезнь сердца;

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения;

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания;

ЦВБ – цереброваскулярная болезнь.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 г. N 404н

"Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"